XI. *Obſervatio Defectus Lunæ habita (tubo optico optimæ notæ, longo pedes* Pariſienſes *ſeptem)* Patavii *VI. Id.* Octob. **1726.** *ab eodem Viro Clariſſimo.*

Temp. Appar. H.	′	″	
16	16	44	Penumbra diluta.
	18	54	Penumbra denſior.
	21	19	Umbra ad Lunæ limbum.
	31	35	Attingit Mare Humorum.
	35	47	Attingit Grimaldum.
	38	34	Diſtat a Tychone diametro Tychonis ipſius, & Grimaldum tegit tertia ejuſdem Grimaldi parte.
	50	40	Fere attingit Pitatum.
17	3	41	Lansbergium tegit.
	7	45	Attingit Reinoldum.
	15	56	Attingit Fracaſtorium, & Galileum.
	25	53	Attingit Mare Fœcunditatis.
	39	6	Umbra proxima eſt ad Reinoldum, tegitque partem tertiam Maris Fœcunditatis.
	46		Grimaldus emergit.
	54	53	Grimaldus jam diſtabat ab umbra diametro majore ſui integra.
18	5	44	Gaſſendus totus modo extra umbram, Mare Fœcunditatis dimidia cirtiter parte detectum, inter dehiſcentes nubes videbantur.
			Quæ nubes ad Finitorem deinde coactæ occiduam Cæli partem penitus obumbravere; neque Luna poſterius apparuit.